



agro**equipos**

INNOVACIÓN PECUARIA





ANTIBIOTICO EN AGUA

SUCLORTRIM 75

Indicaciones

En aves y porcinos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp, Haemophilus sp. y Bordetella sp, Pasteurella sp. y Salmonella sp.

Dosis y modo de empleo

Para uso vía oral en el alimento o en el agua de bebida, aves y cerdos. Aves 24 mg de principio activo/KG de peso vivo.

ESPECIE	PESO EN KG	SUCLORTRIM75 alimento (g/ton) x 7 días
Lechones lactantes	Hasta 12 kg	1200-1600
Lechones destete	5 – 23	640-800
Cerdos de ceba	23 - 105	800-1200
Cerdas antes y posparto	Promedio 175 kg	1700-1800
Cerdas en lactancia	Promedio 175kg	800-1200

Presentación: sobres de 500 gr.





ANTIBIOTICO PREMIX

TYLOVIC PREMIX

Indicaciones

En aves y cerdos para el tratamiento de bacterias susceptibles a la tilosina. En cerdos para el tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por *Lawsonia intracellularis*. En aves para el tratamiento de enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens*.

Cada 100 g de TYLOVIC PREMIX contiene:

Tilosina base (como tilosina fosfato 10,0 g 9,0 g Excipientes c.s.p 100 g.

Dosis y modo de empleo

Cerdos: 100ppm, equivalentes a 1.1 kg de TYLOVIC®PREMIX por tonelada de alimento durante 21 días.

Aves: (pollo de engorde y aves de reemplazo): 100ppm, equivalentes a 1.1 kg de TYLOVIC®PREMIX por tonelada de alimento durante 7 días.

Presentación: bolsa de 25 kg.





TIAMULIN CG 30%

Indicaciones

En aves (pollos de engorde, aves de reemplazo y reproductoras) para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC) ocasionada por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis*. En cerdos para el tratamiento y control de la neumonía enzoótica ocasionada por *Mycoplasma hyopneumoniae*, y complicada por *Mycoplasma hyorhinis*, *Pasteurella* sp, *Haemophilus* sp, Control de la Disentería porcina ocasionada por *Brachyspira hyodysenteriae*, Colitis Porcina causada por *Brachyspira pilosicoli* y Enteropatía Proliferativa Porcina causada por *Lawsonia intracellularis*.

Cada 100 g de Tiamulin CG 30% contienen:

TIAMULINA FUMARATO CG 30 g

Excipiente c.s.p 100 g

Dosis y modo de empleo

En cerdos 4 – 8 mg/kg de tiamulina. En cerdos para el control de Neumonía Enzoótica y Disentería Porcina suministrar 100 g de Tiamulin® CG 30% por tonelada de alimento por 10 días. Para el tratamiento de Neumonía Enzoótica y control de Colitis Porcina y Enteropatía Proliferativa porcina, suministrar 600 g por tonelada de alimento durante 10 a 14 días. Otra dosificación a criterio del Médico Veterinario.

Presentación: bolsa de 25 kg.





FARMACO EXPECTORANTE

BROMHEXOL NF

Indicaciones

En aves y cerdos como broncosecretolítico y expectorante en enfermedades respiratorias que cursan en secreciones de moco y con aumento de la viscosidad. Como coadyuvante en Aves: Enfermedad respiratoria Crónica. Cerdos: Neumonía y bronco-neumonía en general, tos mecánica por alimentos polvorientos.

Cada de 100 ml BROMHEXOL® NF contiene:

Bromhexina Clorhidrato	0,30 g
Guayacolato de glicerilo	2,00 g
Eucaliptol al 60%	7,00 g
Excipientes c.s.p	100 mL

Dosis y modo de empleo:

Aves: De 0.5 – 1.0 ml de BROMHEXOL® NF por litro de agua (1.5 – 2.0 L de BROMHEXOL® NF para 5.000 aves) por 3 a 5 días.

Cerdos: 15 a 20 ml por animal/día durante 3 a 5 días.

Presentación: GAL 3,78 LTS

