




agro**equipos**  
INNOVACIÓN PECUARIA





## ANTIBIOTICO EN AGUA

### ENFLOX

Es un producto líquido a base de enrofloxacin que se mezcla con agua potable. Este producto antimicrobiano está indicado para aves y ganado porcino en caso de que resulte necesario el tratamiento de infecciones gastrointestinales y respiratorias provocadas por: *Escherichia coli*, *Mycoplasma spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium pyogenes*.

**Dosificación:** La dosis recomendada para cerdos es de 0.5 ml de ENFLOX para cada 20 kg de peso vivo, durante 3 en intervalos de 24 hs. En caso de infecciones respiratorias severas la dosis puede aumentar hasta 1 ml de ENFLOX para cada 20 kg de peso vivo durante 3 días en intervalos de 24 hs.

**Ingrediente activo:** Enrofloxacin 10%

**Indicaciones:** Tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio y digestivo.

**Presentación:** frasco de 1 litro.



## NEO-TC

Asociación antibiótica sinérgica en polvo soluble para aves y cerdos

### Ingredientes activos

Oxitetraciclina (en forma de clorhidrato) 27,5% / Neomicina (en la forma de sulfato) 19,5%

### Indicaciones

Tratamientos de enfermedades del tracto respiratorio y digestivo.

### Dosificación y modo de empleo

Vía oral, a través el agua de bebida o de las raciones:

En agua de bebida: Disolver el contenido de un sobre (200g) de Neo-TC en 500 Lts. de agua. Realizar el tratamiento por un periodo de 3 a 5 días.

En la ración: Mezclar 1 a 2 Kg. (5 a 10 sobres) de Neo-TC por tonelada de ración, administrado a libre acceso por un periodo de 3 a 5 días. La dosis terapéutica es de 30 mg/Kg de la asociación.

**Presentación:** sobres aluminizados de 200 gr.





## ANTIBIOTICO PREMIX

### AURION

Asociación sinérgica de clortetraciclina con sulfametazina, trimetropim y ácido cítrico para suinos y aves.

#### Ingredientes activos

Clortetraciclina 10%

Sulfametazina 7.5%

Trimetropim 1.5%

Ácido Cítrico 10%

#### Indicaciones

tratamiento en enfermedades respiratorias, digestivas y articulares de aves y cerdos de bacterias sensibles al producto.

#### Dosis y modo de empleo

Vía oral mezclado en la ración 3 a 4 kg por tonelada de ración 5 a 7 días consecutivos.

**Presentación:** bolsa de 25kg.





## TRIMOXIL 50 PREMIX

Antimicrobiano a base de Penicilina Semi-sintética para suinos y aves

Ingredientes activos: Amoxicilina 50%

**Indicaciones:** Tratamientos de problemas respiratorios, infecciones gastrointestinales, y articulares causadas por bacterias sensibles a los efectos de la penicilina.

**Dosificación y modo de empleo:** 20mg de amoxicilina para cada Kg, de peso vivo por 5 a 7 días (acción tiempo dependiente).

**Presentación:** bolsa de 25 kg.





agro**equipos**  
INNOVACIÓN PECUARIA

## **AMPHENOR 50**

Antibacteriano de amplio espectro a base de Florfenicol al 50% para suinos.

**Ingrediente activo:** Florfenicol 50%

### **Indicaciones**

Tratamientos de enfermedades respiratorias de los cerdos

### **Dosificación y modo de empleo**

4 mg de florfenicol para cada Kg, de peso vivo por 5 a 7 días.

**Presentación:** balde de 5kg.





## SPECTRUM 50 PX

Antibacteriano a base de Doxiciclina para suinos y aves.

**Ingrediente activo:** Doxiciclina 50%

### Indicaciones

Tratamientos de enfermedades de cerdos y pollos de engorde causadas por *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli* y *Bordetella bronchiseptica*.

### Dosificación y modo de empleo

20 mg de doxiciclina por cada Kg, de peso vivo por 5 a 7 días.

**Presentación:** bolsa de 25kg.



## VITAMINAS - ELECTROLITOS

### CELTZ® EF PLUS

Suplemento vitamínico hidrosoluble superconcentrado en tabletas efervescentes para aves y cerdos.

#### CELTZ® EF PLUS ES FUENTE DE:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nicotinamida          | Vitamina B12 |
| Pantotenato de Calcio | Vitamina B6  |
| Sódio                 | Vitamina C   |
| Vitamina A            | Vitamin D3   |
| Vitamina B1           | Vitamina E   |
| Vitamina B2           | Vitamina K3  |

#### Indicaciones

La suplementación vitamínica está indicada en situaciones de estrés causado por alojamiento, hacinamiento, reacomodos, transporte, despique, calor excesivo, reacciones vacunales e infecciones clínicas y subclínica y, demás situaciones que puedan generar bajo consumo de alimento. Es una estrategia importante para el mantenimiento de los parámetros productivos y desempeño de los animales.

#### Modo de uso

Pollitos: 1 tableta de Celtz® EF Plus en 250 litros de agua de bebida.

Pollos de engorde, ponedoras y reproductoras: 3 a 5 tabletas de Celtz® EF Plus en 1000 litros de agua de bebida.

**Cerdos: 5 tabletas de Celtz® EF Plus en 1000 litros de agua de bebida.**

**Presentación:** frasco de 70 g.





## DESINFECTANTES

### GERMON 50

Desinfectante a base de amonio cuaternario con una concentración del 50%

#### Indicaciones

antimicrobiano, tensoactivo desnaturalizador de proteínas, no corrosivo e irritante.

#### Dosificación y modo de empleo

Pre lavado de instalaciones y equipamientos 1:2500 a 1:3000

**Presentación:** frasco de 1 litro/bidón de 20 litros.





## STALOSAN F

Alta tecnología en la reducción de la presión de infección a seco.

STALOSAN F es un polvo 100% mineral, listo para usar, que actúa reduciendo la humedad y el pH del ambiente, interfiriendo así con las funciones celulares y la integridad de la membrana plástica de los microorganismos.

**STALOSAN F es eficaz en presencia de materia orgánica, reduciendo la presión de infección ambiental.**

- 100% seguro, puede usarse en presencia de animales.
- Activo incluso de materia orgánica.
- Listo para el uso del mismo.
- Reduce la presión de infección ambiental.

