



VADEMECUM **2026**


Hyogen®

CON **Imuvant™**

Protección superior contra
**Neumonía
Enzoótica.**



Si es **Mycoplasma**, la respuesta es
Hyogen®. Única, potente y comprobada



Rápida protección después de la vacunación y protección prolongada con **una sola dosis** hasta las 26 semanas de vida.



Cepa actualizada y altamente inmunogénica.



Imuvant J5 potencia la respuesta inmune celular en el lechón.

INDICACIÓN

Inmunización de cerdos contra la neumonía enzoótica porcina, causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

COMPOSICIÓN

Bacterina de *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado cepa 2940

MODO DE USO



Inyectable
intramuscular



Única dosis de 2 ml a
partir de las 3 semanas
de edad



Vacunar los cerdos en
el lado del cuello

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar sin congelar y
mantener refrigerado entre

2°C – 8°C

PRESENTACIÓN



DESCARGA FICHA TÉCNICA


Hyogen®



FORCERIS™

➤ *Acción única para un buen arranque*

Un nivel superior para
tus lechones



Prevención de la anemia

ferropénica en los lechones y control de la diarrea neonatal causada por *Cystoisospora suis*



Cómodo, **ahorra tiempo**

INDICACIÓN


Prevención de coccidiosis y suplementación de hierro en lechones.

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

- Toltrazuril 30,0 mg
- Gleptoferron 355,2 mg (Hierro 133,4 mg)

PRESENTACIÓN



MODO DE USO



Inyectable
intramuscular



Una sola dosis por lechón (1,5ml), aplicada a partir de las 24 horas de vida

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura inferior a


30°C

DESCARGA FICHA TÉCNICA

FORCERIS™

ECOPORC SHIGA®

Seguridad eficaz contra una
amenaza silenciosa.



Induce anticuerpos
contra la Shigatoxina



Administración IM entre
el **día 3 o 4 de vida**



Inmunidad: Inicio a los 21
días post aplicación,
duración hasta 105 días

La combinación perfecta: **ECOPORC SHIGA® + FORCERIS™**

INDICACIÓN

Inmunización activa de lechones desde los 4 días de vida para reducir la mortalidad y los signos clínicos asociados a la enfermedad de los edemas, causada por la toxina Stx2e producida por cepas STEC de *Escherichia coli*.

COMPOSICIÓN

Antígeno recombinante de la toxina Shiga 2e (Stx2e) genéticamente modificado.

MODO DE USO




Inyectable intramuscular, única dosis por lechón (1ml) en lechones a partir de los 4 días de vida

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar protegido de la luz sin congelar. Refrigerado entre

2°C - 8°C

PRESENTACIÓN



DESCARGA FICHA TÉCNICA



ECOPORC SHIGA®